



VACUNA EN FRONT DE LA MENINGITIS B (**Bexsero®**)

S'ha autoritzat a Espanya la primera vacuna en front al meningococ B, *Bexsero®*, bactèria que pot ser la causa de la Malaltia Meningocòccia invasiva (meningitis i/o sepsis). Aquesta vacuna serveix per a la vacunació activa de nens a partir dels dos mesos d'edat. Pot protegir contra el 70-80% de les soques de meningococ B que hi ha a Europa.

Es tracta d'una malaltia poc freqüent però molt greu, que produeix seqüeles importants i una mortalitat que pot arribar al 10% (1 de cada 10 afectats pot morir). La malaltia afecta sobretot a nens petits i adolescents joves.

- **Hi ha altres vacunes disponibles contra el meningococ?**

Hi ha varies vacunes per fer front als diferents serogrupos de meningococ. La vacunació en front al meningococ C forma part dels calendaris de totes les comunitats autònomes espanyoles. S'ha demostrat molt eficaç i el nombre de casos ha disminuït molt des de la seva introducció en el calendari general.

- **Quina és la situació a Europa de la vacuna *Bexsero®*?**

Des d'agost del 2014, està disponible la vacuna en front al meningococ B (es diu *Bexsero®*), però només des del 23 de setembre del 2015 s'autoritza la seva venda a farmàcies. En el Regne Unit i en altres regions europees s'inclou en el calendari oficial de vacunacions per a lactants des dels dos mesos d'edat.

- **Quina és la posició del Comitè Assessor de Vacunes (CAV) de la Associació Espanyola de Pediatria (AEP)?**

L' AEP aconsella la vacunació en front al meningococ B per a tots els nens a partir dels dos mesos d'edat. La vacuna és obligatòria en el cas de no tenir melsa, patir un dèficit de complement (un element defensiu de l'organisme molt important contra aquest germen), està rebent tractament amb *eculizumab* o haver patit un cas de malaltia meningocòccia invasiva.

- Com s'administra la vacuna?

Els lactants petits han de rebre 4 dosis. Les tres primeres als 2,4 i 6 mesos i una dosis de reforç entre els 12-15 mesos d'edat. També es possible administrar-la als 3,5 i 7 mesos.

Amb les dades actualment disponibles, el **CAV-AEP** recomana:

1. Administrar la vacuna en front al meningococ B (Bexsero®) de forma separada a la resta de vacunes injectables del calendari, amb una pauta de 3, 5 i 7 mesos o al menys amb un interval de dues setmanes respecta a les vacunes habituals.
2. Amb aquesta pauta no seria necessari l'administració de paracetamol profilàctic.
3. La dosis de reforç, en el cas dels lactants que han rebut les 3 dosis durant el primer any de vida, s'administrarà entre els 13 i 15 mesos.

I en els nens més grans, la pauta varia segons l'edat d'inici de la vacunació.

POBLACIÓ	VACUNACIÓ 1 ^{ia} Nº DOSIS	INTERVAL MÍNIM ENTRE DOSIS	DOSIS REFORÇ	Nº TOTAL DOSIS
Lactants de 2 a 5 mesos	3	1 mes	Si, 1 dosis entre els 12 i 15 mesos d'edat	4
Lactants no vacunats de 6 a 11 mesos	2	2 mesos	Si, 1 dosis en el 2 ^{on} any de vida amb un interval, d'almenys, 2 mesos entra la primovacunació i la dosis de reforç	3
Lactants no vacunats de 12 a 23 mesos	2	2 mesos	Si, 1 dosis amb un interval de 12 a 23 mesos entra la primovacunació i la dosis de reforç	3
Nens de 2 a 10 anys	2	2 mesos	No	2
Persones des dels 11 anys d'edat	2	1 mes	No	2

- Quines són les reaccions adverses a la vacunació i les precaucions?

Les reaccions solen ser lleus. Les més habituals són el dolor i l'envermelliment en el lloc de la injecció; i febre i irritabilitat (sobretot si s'administra conjuntament amb altres vacunes). Per tal de minimitzar-los o evitar-los, es recomana l'administració de paracetamol.

La vacunació no està finançada pel Sistema Nacional de Salut, excepte per a persones amb determinades immunodeficiències i els que han tingut la malaltia anteriorment.

A partir del Novembre de 2015, al **CEP Ferrés**, disposarem de **Bexsero®**. El seu preu serà de 105 €.